

โบรอนในปาล์มน้ำมัน



ภาวะขาดแคลนโบรอน



ใบหงิก



ปาล์มไม่เติบโตเต็มวัย



การเกิดผลลม

โบรอนจำเป็นแก่:

- การป้องกันไม่ให้ “ใบไม่มีรูปทรงก้างปลา” (ใบไม่มีขนาดเล็กและบางมาก)
- การป้องกันไม่ให้ “ใบไม่มีรูปร่างเหมือนตะขอ” (ตะขอเดี่ยวหรือคู่ตรงใบไม้ใกล้บริเวณปลาย)
- การกำจัดริ้วสีขาวบนใบไม้
- การป้องกันมิให้ผลไม้ที่ยังไม่โตเต็มที่ไม่มีเมล็ด
- มีปริมาณผลไม้สดใหม่อย่างเพียงพอ
- กระตุ้นการเจริญเติบโตของราก

ปริมาณโบรอนที่เพียงพอ

ปาล์มน้ำมันจะดูดซึมโบรอนในปริมาณที่มีนัยสำคัญจากดินทุกปี

อัตราการดูดซึมโบรอนของปาล์มน้ำมันต้นอ่อนและต้นที่เจริญเติบโตเต็มที่แล้วขึ้นอยู่กับสภาพดินและเป้าหมายของผลผลิต

ปรึกษานักปฐพีวิทยาของ U.S. Borax เกี่ยวกับการให้โบรอนในระดับที่เหมาะสมเสมอ



ปุ๋ยโบรอนในปริมาณที่เพียงพอและแร่ธาตุที่สมดุลจะทำให้ได้ผลไม้มันที่ดี

คำแนะนำ

คำแนะนำสำหรับดินที่มีโบรอนในปริมาณต่ำมาก (<0.02 ppm) การให้ธาตุโบรอนขึ้นอยู่กับสิ่งที่ปลูก ประเภทดิน การวิเคราะห์ใบไม้และการวิเคราะห์ดิน

Fertibor / Granubor ในปาล์ม

อายุของปาล์ม	6 เดือน	1 ปี	1½ ปี	2 ปี	2½ ปี	3 ปี	ตั้งแต่ 3½ ปีขึ้นไป
กรัม/ปาล์มหนึ่งต้น	25	1,	31	- , ,	- .1	-1,	: -1, .1, &



* 200-250 กรัมต่อปาล์มหนึ่งต้นต่อปี หากผลผลิตมากกว่า 25 ตันต่อเฮกตาร์ต่อปีหรืออยู่ในพื้นที่ที่มีฝนตกชุก (>3,000 มม./ปี). แนะนำให้แบ่งใช้หากใช้งานในปริมาณมากกว่า 250 ก. ต่อปาล์มหนึ่งต้นต่อปี

ความเข้มข้นของ Solubor ขณะหวานเมล็ด

13.6 ก.

น้ำ 100 ลิตร

ตัวเลือกปุ๋ยโบรอนของคุณ

GRANUBOR® เหมาะสมแก่ การผสมแบบแห้ง ๆ เพื่อใช้ ในดินที่สด

FERTIBOR® สำหรับการ ใช้ ในดินแบบแยกต งหากและการใช้ เสริม

SOLUBOR®

ผลิตภัณฑ์ ที่ยืดหยุ่น ซึ่งสามารถละลายในน้ำเพียงอย างเดียว ปุ๋ยเหลวหรือสารเคมีกำจัดศัตรูพืช และสามารถนำไปใช้กับดินหรือต้นปาล์มโดยตรง

20 MULE TEAM BORAX™

RioTinto

agriculture.borax.com



2 จาก 2 (10/2021)